

Røynebergsand – lovande kaliumgjødsel

Kalium til planteernærings har vore ein av dei store bøygane i økologisk landbruk. Tilgang på godt steinmjøl til overkommeleg pris arbeider vi aktivt med, og biotitthaldig gneis frå Jæren har gitt gode resultat i forsøk. Det bør også ha interesse for konvensjonelt landbruk der jorda er fattig på leire og glimmermineral.

Tekst: **KARL-JAN ERSTAD**
Rådgivande Agronomar AS
INGER E. B. SLÅGEDAL
Forskningsringen Agder – økologisk landbruk
Foto: **PEDER MALMIN**




Kalium frå bergverksmineral

Heilt sidan mangelåra under 1. verdskrigen har vi i Noreg vore opptatt av å finne norske mineralske råstoff som kunne nyttast i planteernæringsa, og i dei siste 15-20 åra har vi arbeidd med ulike steinmjøl, spesielt for økologisk landbruk.

For å konkurrere direkte med lettøyselege K-kjelder i konvensjonelt landbruk har vi kalkulert at drift på nye

førekomstar krev at salpetersyreløyseleg K (7 M syre) må ligge på 2-5 % og sikteturva helst vere 0-0,5 mm, alt avhengig av produksjons-, transport- og spreiekostnader.

Dermed har vi ved forsking ofte arbeidd med slike ideelle K-haldige steinmjøl som ikkje har vorte tilgjengelige for bøndene. Årsaksforholdet har vore fleirsidig, både manglande faktisk utvinning, potensielt høge kostnader, og tilsvarande svak etterspurnad frå landbruket.



Derfor har vi sett om det kan finnast igangverande berg- eller pukkverk som har interessante avgangar, finstoff med tilgjengeleg kalium til ein rimeleg pris. For sideprodukt i ein større produksjon vert det ofte berre rekna marginal-kostnader.

Biotitthaldig gneis frå Sola på Jæren

Vi har no prøvd ut finsand 0-2 mm frå Røyneberg Pukkverk i Sola, som ligg under Norstone AS i Sandnes. Bergarten i Røyneberg er hornblende-førande biotittgneis, med 15% biotitt, og totalt innhald av K (kalium) er 1,1% (målt i 7 M salpetersyre), mens ei litt svakare salpetersyre (1 M) gir 0,8% K-HNO₃, som er ein vanleg test for kaliumreservar. For øvrig er det litt Ca og Mg i dette steinmjølet, og det har ein viss kalkverknad, med ein NV (nøytraliserande verdi) på 5, litt under tiendedeparten av ein dolomitt.



Først hadde vi eit veksthusforsøk saman med Jæren forsøksring. Resultatet såg ganske lovande ut, jamvel om dette innleieande forsøket ikkje var ei fullstendig utprøving.

I perioden 2003-2005 har det så vore gjennomført eit forholdsvis enkelt forsøks- og demonstrasjonsopplegg på tre stadar hos Forskningsringen Agder – Økologisk Landbruk. Det nøkterne forsøksopplegget har gitt klare resultat, over forventning.

Røynebergsand i store dosar

Feltet var lagt ut av Forsøksringen Agder på 3 forsøksfelt hos i alt 2 forsøksvertar som driv økologisk engdyrkning. Dei utvalde område låg i Birkenes og Vennesla. Jordtypene er typisk kaliumfattige, med jordart frå skarp sand til meir organisk rik sand på eine feltet. Kvart felt var samansett av 3 storruuter, den minste var ei forholdsvis smal 0-rute, mens dei 2 litt større var husdyrgjødsel og husdyrgjødsel + steinmjøl. Husdyrgjødsel vart tilført i mengder som var normale for teigane på gardane, 2 til 3 tonn storfegylle/daa både om våren og etter 1. slått. På eine feltet vart det brukt 1 tonn Biokompost/daa våren 2005.

Steinmjølet var 1 tonn Røynebergsand 0-2 mm pr. daa kvar vår.

Felta vart ikkje avlingsregisterert, men det vart tatt rutevise planteprøver ved alle slåttar. For nokre felt og år var det også ein 3. slått.

Innleiande jordprøver vart tatt våren 2003, og med unntak av våren 2004 (redusert jordprøvetaking) vart det tatt rutevise jordprøver kvar haust og vår i 3-årsperioden.

Stadig sterkare K-effekt på plantane

Det var svært små synlege skilnader mellom rutene over forsøksåra, med eit visst unntak for 0-leddet, som etter kvart vart litt forpunkt utan gjødsel av noko slag. Med ein misvekst som utviklar seg ved nitrogenmangel, vil kjemiske parametrar framvise ein del abnorme verdiar grunna ubalanse i planteernaeringa.

I 2003 var det ingen klare og systematiske utslag på dei kjemiske parametrane på dei ulike rutene. Berre hos Fjellestad 1 hadde rute 1 (Røyneberg-sand + husdyrgjødsel) tendens til høgre K-innhald i plantematerialet når vi ser på begge slåttane under eitt.

Men deretter utvikla skilnadene seg stadig sterkare, jamvel om K-innhaldet under ingen omstende kom under kritisisk nivå på 1% av plantetørrstoff sjølv




Fig. 1. Rutevise K-HNO₃-jordanalyser for felta i Birkenes og Vennesla I og II, hausten 2005
Rute 1 : Røynebergsand + husdyrgjødsel. Rute 2 : 0-ledd. Rute 3 : Husdyrgjødsel

på 0-rute, der ein kan vente fullstendig kollaps. I 2004 var det aukande tendens utover i sesongen til at Røynebergsand gav merkbart høgre K-innhald i plantetørrstoff, og i 2005 var det statistisk sikre resultat. Tilsførselen gav ein varig og aukande effekt på K i plantane, og jamt over låg innhaldet i området 2-3% av plantetørrstoff i 2005.

På samme tid ser det også ut til at Røynebergsand kan tilføre monnalege mengder Ca (kalsium) og Mg (magnesium) ved denne bruken, men effekten synest sterkest ved nytiført materiale, som det viste seg ved 1. slått.

Oppbygging av K-reservar i jord

Ganske raskt byrja vi å māle effekt på tungtløyseleg K-reservar i jord. Alt første hausten var tendensen til auke i K-HNO₃-tala heilt klar. Deretter vart talmaterialet stadig sikkare, og hausten 2005 var utsлага høgst statistisk sikre for K-HNO₃-effekten (fig. 1), mens også lettłøyseleg kalium (K-AL) nærma seg statistisk sikkert nivå ($F=9\%$). Utan husdyrgjødsel vart jamvel tungtløyseleg kalium merkbart redusert over forsøksperioden.

Utan at vi enno kan slå det fast med visse ser det ut til at vi har bygd opp

slige reservar av kalium i jord at ein dose på 1 tonn Røynebergsand pr. daa og år er i overkant av det vi treng for vedlikehald i framtida. Dersom vi gradvis kan redusere mengdene, vert også det økonomiske reknestykket stadig betre. Det er eit klart alternativ for økologisk landbruk, men ser også interessant ut for det konvensjonelle. Mindre av lettłøyselege gjødselkjelder gir dessutan betre kvalitet på produkta – høgre tørrstoffinhald og mindre mineralsk antagonisme.

Tilgjengeleg steinmjøl

Som ein avgang frå pukkproduksjonen kan det leverast steinmjøl som bulkvare som toler fukt. Leveranse med båt ved kysten, direkte ut til bønder eller via enkelte hamnelager kan vidare halde kostnader nede. Arbeidssparande spreiling kan skje v.h.a. kalkvogner, og tid i hektisk våronn kan gjerne sparast inn ved spreiling under gode vērtilhøve på ettervinter og tidleg vår.

Årsrapportane for 2003 og 2004-05 kan lastast ned frå Internett på denne adressa:

<http://www.raadgivande-agronomar.no> (Nyhende)